

## تأثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس (*Bacillus subtilis*, *B. licheniformis*) بر تراکم، فاکتورهای رشد در تراکم‌های مختلف و ترکیبات لاشه میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*)

- **حمید رئیسی\***: گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 49138-15739
- **ولی‌اله جعفری**: گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 49138-15739
- **سعید ضیایی‌نژاد**: گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان
- **علی‌اکبر پاسندی**: اداره کل شیلات استان گلستان، گرگان

تاریخ دریافت: فروردین 1393 تاریخ پذیرش: تیر 1393

### چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر استفاده از باکتری‌های *Bacillus subtilis* و *Bacillus licheniformis* بر

بر

شاخص‌های رشد میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*) در تراکم‌های مختلف می باشد. در این تحقیق میگوها پس از ذخیره سازی با دو تیمار 250 و 300 قطعه در هر متر مربع هرکدام به‌وسیله دو غلظت پروبیوتیکی  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم و  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم (به مدت 8 هفته پرورش داده شدند. در انتها، شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و تعداد باکتری‌های کل دستگاه گوارش بررسی شدند. شاخص‌های رشد در تیمارهای T2 (تراکم 300، پروبیوتیک  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم) و T4 (تراکم 250، پروبیوتیک  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم) نسبت به گروه شاهد C1 (300 با غلظت پروبیوتیک صفر) و C2 (تراکم 250 با غلظت پروبیوتیک صفر) دارای اختلاف معنی‌داری بود ( $p < 0/05$ ). در تیمارهای T1 (تراکم 300، پروبیوتیک  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم) و T3 (تراکم 250، پروبیوتیک  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم) رابطه معنی‌داری با گروه شاهد و تیمارهای T2 و T4 نشان نداد. تأثیر تراکم بر شاخص‌های رشد عدم اختلاف معنی‌داری را بین تیمارهای مختلف بیان کرد ( $p > 0/05$ ). تعداد کل باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش در تیمارهایی که از غلظت  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم و  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم استفاده شده بود، نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌داری بین این تیمارها بود ( $p < 0/05$ ). براساس نتایج این آزمایش، استفاده از غلظت  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم سبب بهبود شاخص‌های رشد، ترکیبات لاشه و فلور باکتریایی دستگاه گوارش میگوی وانامی شد، اما تراکم تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه نداشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش میزان تولید میگوی وانامی از غلظت  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم استفاده شود.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، میگو، تراکم، فلور باکتریایی، هضم‌پذیری، دستگاه گوارش

### مقدمه

ذخایر آبزیان به شدت در حال افزایش است. به همین منظور افزایش تولید از طریق روش‌های پرورشی و افزایش

آبزی‌پروری در سرتاسر جهان به واسطه افزایش تقاضا و کاهش



داشته باشد. پروبیوتیک (*Bacillus* sp) می‌تواند از طریق افزایش سطح ایمنی میگو سبب افزایش مقاومت در مقابل عوامل بیماری‌زا شده و بازماندگی را افزایش دهد (Liu، 2010). هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس بر تراکم، فاکتورهای رشد در تراکم‌های مختلف و ترکیبات لاشه میگوی وانامی بود.

### مواد و روش‌ها

**پروبیوتیک:** پروبیوتیک استفاده شده در این مطالعه حاوی اسپوره‌های دو گونه از باکتری‌های *B. subtilis* و *B. licheniformis* می‌باشد. این پروبیوتیک حاوی  $10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم می‌باشد. این محصول به صورت پودر خشک توسط شرکت سازنده (پروتکسین آکواتک) عرضه می‌شود. روش فعال‌سازی براساس شیوه توصیه شده این شرکت صورت گرفت. براین اساس، جهت ایجاد شوک حرارتی، آب را تا نزدیک نقطه جوش حرارت داده، پس از جوش آمدن ظرف را از روی آتش برداشته و پروبیوتیک را به آن اضافه کرده و پس از سرد شدن، آب حاوی پروبیوتیک با غذای کنسانتره مخلوط و مورد استفاده قرار گرفت.

**ذخیره سازی:** مطالعه حاضر در کارگاه آموزشی تکثیر گمیسان بر پست لارو مرحله 12 وانامی (وزن تقریبی 0/29 گرم) در 18 تانک 200 لیتری انجام پذیرفت. این آزمایش شامل شش تیمار با سه تکرار بود. تیمار T<sub>1</sub> شامل میگوهای با تراکم 300 قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم غذا، T<sub>2</sub> تراکم 300 قطعه در متر مربع و غلظت پروبیوتیک  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم غذا، T<sub>3</sub> تراکم 250 قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  $1 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم غذا و T<sub>4</sub> تراکم 250 قطعه در متر مربع و غلظت پروبیوتیک  $4 \times 10^{10}$  واحد تشکیل‌دهنده کلنی بر گرم غذا به همراه دو تیمار شاهد C<sub>1</sub> با تراکم 300 قطعه

تراکم از روش‌هایی است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی حفظ ذخایر آبزیان داشته باشد. امروزه استفاده از سیستم‌های مدار بسته که قابلیت پرورش میگو به‌طور فوق متراکم را دارند با توجه به قابلیت ممانعت‌پذیری نسبت به انتقال بیماری‌ها از گونه‌های وحشی به‌طور گسترده‌ای توسط پرورش‌دهندگان مورد توجه قرار گرفته‌اند (Paiva-maia، 2013). یکی از گونه‌هایی که تحمل تراکم‌پذیری را تا 150 عدد در استخرهای پرورش دارد گونه وانامی می‌باشد، این گونه را به راحتی در شرایط کنترل شده با تراکم 400 عدد در هکتار می‌توان پرورش داد (Berigss، 2004). حفظ کیفیت آب در پرورش فوق متراکم یکی از فاکتورهای مهم می‌باشد که جمعیت باکتری موجود در استخر نقش کلیدی را در این امر ایفاء می‌کنند (Sooking، 2012). با توجه به گسترش پرورش میگو به‌طور فوق متراکم ممکن است، محدودیت‌هایی از جمله؛ افزایش بیماری‌های عفونی و غیرعفونی، افزایش مواد مانند نیتريت (Yusoff، 2011)، آمونیاک و فسفر که خود حالت مسمومیتی را برای میگو ایجاد کرده و مشکلاتی را در بحث پرورش فوق متراکم به وجود آورد (Kumaraguru، 2009). بنابراین نیاز است که از طریق روش‌های گوناگون از جمله اصلاح روش‌های پرورش (Castex، 2010)، استفاده از مدیریت باکتریایی به منظور تغییر فلور باکتریایی آب بر افزایش تراکم‌پذیری فائق آمده (Tasang، 2012) و توانسته تا حدودی استرس‌ها موجود را کاهش دهد. پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که به میزبان خود سود می‌رسانند. باسیلوس‌ها از پروبیوتیک‌های غالب می‌باشد که به‌طور عمومی استفاده می‌گردند (Zhou، 2009). مطالعات متعدد نشان می‌دهد که این پروبیوتیک می‌تواند تأثیر موثری بر بهبود رشد، مقاومت نسبت به بیماری‌ها و تحریک دستگاه ایمنی (Zhang، 2010) میگو (Rengpipat، 2000)



گردید (Nejad Ziaei, 2006). میزان طول بدن، طول کارپاس و طول شاخکها و وزن بدن هر هفته مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری وزن بدن از ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01 و جهت اندازه گیری طول بدن و طول شاخکها از کولیس با دقت دهم میلی متر استفاده شده است.

فرمول (1) نرخ رشد ویژه: (لگاریتم رشد نهائی- لگاریتم رشد اولیه)  $\times 100$  / دوره پرورش

فرمول (2) FCR: وزن تر میگو با تولید / وزن خشک غذای خورده شده

**تجزیه و تحلیل آمار:** طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی می باشد. اطلاعات به دست آمده به منظور مقایسه میانگینها و آنالیز آن ها توسط واریانس دوطرفه (Two Way ANOVA) آزمون دانکن و توکی صورت گرفت و اختلاف بین میانگینها در تیمارهای مختلف با سطح اطمینان ( $p < 0/05$ ) تعیین گردید. تمام موارد با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت.

### نتایج

نتایج تاثیر پروبیوتیک بر فاکتورهای رشد میگو و انامی در جداول 1 و 2 آورده شده است. در ارتباط با وزن نهایی میگو و انامی، نتایج بهتری در تیمارهای T<sub>2</sub> و T<sub>4</sub> مشاهده گردید که در مقایسه با شاهد (C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub>) و دیگر تیمارهای (T<sub>1</sub> و T<sub>3</sub>) سطح بالاتری قرار داشتند و اختلاف معنی داری نیز با شاهد برقرار کرد ( $P < 0/05$ ). تیمارهای T<sub>3</sub> و T<sub>1</sub> که نسبت به تیمار T<sub>2</sub> و 4 مقدار کمتری را نشان داده بود ارتباط ( $P > 0/05$ )، معنی داری را با تیمار شاهد (C<sub>1</sub>) و (C<sub>2</sub>) برقرار نکرد ( $P > 0/05$ ).

میگو در مترمربع و C<sub>2</sub> با تراکم 250 قطعه میگو در مترمربع بودند که به مدت هشت هفته از تیر تا شهریور با میانگین دمایی 28 درجه سانتی-گراد، شوری 32 گرم در لیتر، و اکسیژن محلول 9/8 میلی گرم در لیتر ذخیره سازی شدند (Moss, 2004).

### شمارش تعداد باکتریها:

به منظور نمونه برداری میگوها به آزمایشگاه انتقال داده شدند، نمونه ها از نظر پارامترهای شامل تعداد کل باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه به وسیله چاقوی تمیز کالبدشکافی و لوله گوارش استخراج و در داخل یک هاون هموژن و سپس به مدت 60 ثانیه توسط همزن همگن شدند. تعداد کل باکتریها از طریق روش Rengpipat و همکاران (1998) و Ziaei-Nejad و همکاران (2006) بر روی محیط کشت Nutrient agar و Tryptic soy agar در محلول سرم (با یک درصد NaCl، W/V) تهیه گردید. نمونه هایی که حاوی باکتری و مواد هموژنه بودند در داخل یک لوله ریخته، سپس یک سی سی از این مواد برداشته و در داخل یک لوله ریخته و سپس به طور سریالی به لوله های دیگر منتقل گردیدند. پروبیوتیک در این تحقیق از پلیتهای استاندارد آگار (Standard methods agar plate) استفاده گردید. بعد از انتقال نمونه ها در آن پلیتهای به مدت 48 ساعت در دمای اتاق بالای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بعد از این مدت، کلونیها شمارش، رنگ آمیزی و مورد بررسی قرار گرفتند.

### بررسی پارامترها و معیارهای

**رشد:** زیست سنجی میگوها هر هفته یکبار صورت پذیرفت. مقدار غذایی مصرفی به مقدار 3 درصد وزن بدن میگو بر حسب جیره روزانه تعیین

جدول 1: تاثیر سطوح متفاوت تراکم و پروبیوتیک با سیلوس بر فاکتورهای رشد

| تیمار          | بازماندگی (%)          | نرخ رشد ویژه (%)       | ضریب تبدیل غذایی (%)  | تولید کل (گرم)        | وزن نهایی (گرم)         |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| T <sub>1</sub> | 93/3±0/3 <sup>ab</sup> | 14/6±0/3 <sup>ab</sup> | 1±0/03 <sup>ab</sup>  | 2829±65 <sup>ab</sup> | 10/3±0/2 <sup>ab</sup>  |
| T <sub>2</sub> | 94/6±0/4 <sup>a</sup>  | 14/8±0/3 <sup>a</sup>  | 1±0/08 <sup>a</sup>   | 2856±75 <sup>a</sup>  | 10/6±0/05 <sup>a</sup>  |
| T <sub>3</sub> | 94/8±0/1 <sup>ab</sup> | 15/3±0/1 <sup>ab</sup> | 1±0/06 <sup>ab</sup>  | 2542±72 <sup>ab</sup> | 10/8±7/07 <sup>ab</sup> |
| T <sub>4</sub> | 95±0/8 <sup>a</sup>    | 15/4±0 <sup>a</sup>    | 0/9±0/07 <sup>a</sup> | 2641±65 <sup>a</sup>  | 11/04±0/2 <sup>a</sup>  |



|                      |                      |                       |                        |                       |                |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 9/9±0/2 <sup>b</sup> | 2351±65 <sup>b</sup> | 1/2±0/03 <sup>b</sup> | 14/1±0/2 <sup>b</sup>  | 93±0/6 <sup>b</sup>   | C <sub>2</sub> |
| 9/9±0/4 <sup>b</sup> | 2779±71 <sup>b</sup> | 1/3±0/1 <sup>b</sup>  | 14/02±0/5 <sup>b</sup> | 91/6±0/6 <sup>b</sup> | C <sub>1</sub> |

(± میانگین با 3 تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار است (P<0/05).

## جدول 2: تأثیر سطوح متفاوت تراکم و پروبیوتیک باسیلوس را بر طول کل و طول کاراپاس

| تیمار<br>ا     | طول کاراپاس (سانتی‌متر) | طول کل (سانتی‌متر)     |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| T <sub>1</sub> | 3/8±0/4 <sup>ab</sup>   | 14/3±0/1 <sup>ab</sup> |
| T <sub>2</sub> | 3/9±3/1 <sup>a</sup>    | 14/3±0/6 <sup>a</sup>  |
| T <sub>3</sub> | 3/8±0/6 <sup>ab</sup>   | 14/3±0/1 <sup>b</sup>  |
| T <sub>4</sub> | 4±0/1 <sup>a</sup>      | 14/8±0/5 <sup>a</sup>  |
| C <sub>2</sub> | 3/3±0/1 <sup>b</sup>    | 13/5±0/0 <sup>b</sup>  |
| C <sub>1</sub> | 3/3±0/1 <sup>b</sup>    | 13/2±0/1 <sup>b</sup>  |

(± میانگین با 3 تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار است (P<0/05).

ارتقاء یافت و دارای بیشترین مقدار بود که مانند سایر تیمارها توانست با تیمار شاهد ارتباط معنی‌داری برقرار کند (P<0/05). تیمارهای T<sub>1</sub> و T<sub>3</sub> در تمام شاخص‌های رشد نسبت به تیمار شاهد C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> افزایش، با تیمارهای T<sub>4</sub> و T<sub>2</sub> کاهش غیرمعنی‌داری را نشان داد (P>0/05). تأثیر تراکم در کلیه موارد نشان‌دهنده عدم تأثیر آن بر شاخص‌های رشد در تمام تیمارهایی بود که دارای تراکم 250 و 300 قطعه با هم بودند. بنابراین تراکم نتوانست هیچ تأثیری بین تیمارها ایجاد کند.

**آنالیز لاشه:** نتایج آنالیز لاشه در جدول 3 آمده است.

مقایسه با تیمار شاهد و T<sub>3</sub>، T<sub>1</sub> در سطح بالاتری قرار داشت (P>0/05)، و با C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> اختلاف معنی‌داری نشان داد (P<0/05). ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایش T<sub>1</sub>، T<sub>2</sub>، T<sub>3</sub> و T<sub>4</sub> دارای نتایج بهتری نسبت به گروه شاهد بود. تیمارهای شاهد C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> از لحاظ ضریب تبدیل غذایی کمترین مقدار بود و با تیمارهای T<sub>4</sub> و T<sub>2</sub> ارتباط معنی‌داری برقرار کرد (P<0/05). میزان طول کاراپاس و طول کل بدن میگو، بیش‌ترین مقدار این دو فاکتور مربوط برای تیمارهای T<sub>4</sub> و T<sub>2</sub> و کم‌ترین آن به گروه‌های C<sub>1</sub> و C<sub>2</sub> محاسبه گردید که با هم رابطه معنی‌داری برقرار کردند (P>0/05). بازماندگی در برخی از تیمارها مانند T<sub>4</sub> و T<sub>2</sub> به‌خوبی

## جدول 3: تجزیه تقریبی لاشه میگو در تیمارهای مختلف در انتهای دوره

| تیمارها        | خاکستر                 | چربی                   | پروتئین                 | ماده خشک               |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| T <sub>1</sub> | 12/2±0/14 <sup>a</sup> | 2/8±0/11 <sup>ab</sup> | 61/4±0/35 <sup>ab</sup> | 39/73±1/3 <sup>a</sup> |
| T <sub>2</sub> | 12/3±0/8 <sup>a</sup>  | 2/9±0/33 <sup>a</sup>  | 62/3±0/33 <sup>a</sup>  | 41/3±0/8 <sup>a</sup>  |
| T <sub>3</sub> | 12/4±0/12 <sup>a</sup> | 2/9±0/12 <sup>ab</sup> | 61/6±0/34 <sup>ab</sup> | 40/6±0/6 <sup>a</sup>  |
| T <sub>4</sub> | 12/4±0/17 <sup>a</sup> | 3/2±0/15 <sup>a</sup>  | 62/1±0/54 <sup>a</sup>  | 40/6±0/8 <sup>a</sup>  |
| C <sub>1</sub> | 12/5±0/3 <sup>a</sup>  | 2/6±0/18 <sup>b</sup>  | 60/5±0/5 <sup>b</sup>   | 39/5±0/4 <sup>a</sup>  |
| C <sub>2</sub> | 12/3±0/08 <sup>a</sup> | 2/9±0/17 <sup>b</sup>  | 61/7±0/5 <sup>b</sup>   | 40/5±0/5 <sup>a</sup>  |

(± میانگین با 3 تکرار) حروف متفاوت در یک ردیف نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار است (P<0/05).

که T<sub>4</sub> نسبت به ماده خشک در برابر گروه‌ها از خود نشان داده بود این افزایش در مقدار ماده خشک تیمار T<sub>4</sub> باعث نشد که بین تیمارهای

**ماده خشک:** براساس بررسی انجام شده (جدول 3)، تیمار T<sub>4</sub> دارای بیشترین مقدار و C<sub>2</sub> کمترین مقدار را نشان داد. با توجه به افزایشی



تیمارهای تغذیه شده با غلظت‌های بالای پروبیوتیک  $T_2$  و  $T_4$  با تیمارهای تغذیه نشده در این بخش ارتباط معنی‌داری وجود داشت ( $p < 0/05$ ). اما بین تیمارهایی که از تراکم‌های متفاوت و غلظت پروبیوتیک یکسانی بهره برده بودند، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت که این عمل عدم تاثیر مثبت تراکم را به‌عنوان یک فاکتور مثبت بر چربی لاشه نشان می‌دهد ( $P > 0/05$ ) (جدول 3).

#### پروتئین: تاثیر سطوح مختلف

مکمل‌های پروبیوتیک باسیلوس بر پروتئین ترکیب لاشه میگو، مطابق جدول 3 می‌باشد. گروه‌های شاهد  $C_1$  و  $C_2$  دارای کم‌ترین مقدار  $T_2$  و  $T_4$  دارای بیشترین مقدار پروتئین در ترکیبات لاشه بود. که این اختلاف بین دو گروه باعث ایجاد ارتباط معنی‌داری شد ( $P < 0/05$ )، ولی بین دو گروه  $T_1$  و  $T_3$  با  $T_2$  و  $T_4$  اختلاف معنی‌داری نبود ( $P > 0/05$ ). تیمارهای  $T_1$  و  $T_3$  که دارای غلظت پروبیوتیکی پایین بودند علی‌رغم استفاده از پروبیوتیک رابطه آن با گروه شاهد  $C_1$  و  $C_2$  معنی‌داری نبود ( $p > 0/05$ ). با توجه به آنالیزهای فوق، غلظت بالای پروبیوتیکی را می‌توان به‌عنوان یک عامل مثبت بر پروتئین موجود در لاشه میگو در نظر گرفت. اما تراکم را نمی‌توان به‌عنوان فاکتوری که تاثیر مثبت بر فاکتورهای رشد می‌گذارد بیان کرد.

#### بحث

ایده استفاده از پروبیوتیک به‌منظور افزایش تراکم و بهره‌وری بهتر از مواد غذایی در آبزیان طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای پیدا کرده است. نتایج به‌دست آمده تاثیر مثبت مکمل پروبیوتیکی را بر شاخص‌های رشد نشان داد و در تیمارهایی که از غلظت بالاتری از پروبیوتیک استفاده شده بود، نتایج بهتری را نشان دادند. در تیمار  $T_4$  به‌دلیل استفاده از غلظت بالای پروبیوتیک تمام پارامترهای رشد دارای بیش-

$T_2$  و  $T_4$  با تیمارهای  $T_1$  و  $T_3$  ارتباط معنی‌داری برقرار کند ( $p > 0/05$ ). اما استفاده از پروبیوتیک در گروه‌های  $T_2$  و  $T_4$  سبب شد که بین این گروه‌ها و گروه‌های شاهد  $C_1$  و  $C_2$  ارتباط معنی‌داری برقرار شود ( $P < 0/05$ ). ولی بین گروه‌های شاهد با گروه‌های  $T_1$  و  $T_3$  ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد ( $p > 0/05$ ).

#### خاکستر:

استفاده از پروبیوتیک با غلظت بالا سبب گردد که تیمارهای  $T_4$  و  $T_2$  بیشترین مقدار خاکستر را داشته باشند. ولی با تیمارهای دیگر  $T_1$  و  $T_3$  که مقدار غلظت متفاوتی از پروبیوتیک را دریافت کرده بودند، ارتباط معنی‌داری را برقرار نکرد ( $p > 0/05$ ). میزان خاکستر در تیمارهای  $T_2$ ،  $T_4$ ،  $T_1$  و  $T_3$  به‌دلیل استفاده از پروبیوتیک نسبت به  $C_1$  و  $C_2$  بیشترین مقدار را از خود نشان دادند ولی با توجه به این مورد با این تیمارها (شاهد) اختلاف معنی‌داری نشان ندادند ( $p > 0/05$ ) (جدول 3). نتایج نشان می‌دهند که استفاده از تراکم فقط جز به افزایش محسوس نمی‌تواند تاثیر قابل توجه‌ای روی خاکستر موجود در بدن میگو داشته باشد ( $P < 0/05$ ). خاکستر موجود در لاشه میگو متاثر از پروبیوتیک و تراکم نمی‌باشد و هر دو فاکتور نمی‌توانند بر این ترکیب تاثیر بگذارند. که این خود نشان‌دهنده عدم رابطه معنی‌دار بین گروه شاهد و گروه‌های پروبیوتیکی می‌باشد که دارای تراکم‌های متفاوتی بودند.

#### چربی:

بررسی چربی موجود در لاشه میگوی وانامی در انتهای دوره آزمایش نشان داد که عدم استفاده از پروبیوتیک در گروه شاهد  $C_1$  و  $C_2$  سبب کاهش در مقدار چربی موجود در لاشه این تیمارها می‌شود، که نسبت به گروه  $T_1$  و  $T_3$  افزایش معنی‌داری را نشان نداد ( $P < 0/05$ ). نتایج برآمده از جدول 3، تیمار  $T_4$  بیشترین مقدار  $C_1$  کم‌ترین مقدار چربی لاشه را به خود اختصاص داده بودند که به‌همین منظور بین



بودند شاخص‌های رشد بالایی را نسبت به گروه شاهد از خود نشان دادند که این خود نشان‌دهنده تأثیر غلظت‌های بالای پروبیوتیک بر گونه-های میگو می‌باشد. Hossain و همکاران (2013) بیان کردند، بین افزایش غلظت پروبیوتیک و مقاومت میگو و رشد میگو یک رابطه مستقیم وجود دارد. افزایش تراکم پروبیوتیک سبب افزایش فضا برای آن می‌شود و رقابت جهت بهره‌گیری آب و غذا برای باکتری افزایش می‌یابد، در نتیجه این باکتری‌ها با تولید آنزیم‌هایی نظیر آمیلاز، پروتئاز و لیپاز (Tovar, 2002) سبب افزایش آنزیم‌ها و افزایش قابلیت هضم چربی‌ها و پروتئین می‌گردند، درنهایت رشد، کارایی تغذیه و ترکیبات موجود در لاشه را افزایش می‌دهد (Ray, 2010). مطابق نتایج میزان خاکستر و ماده خشک دو تیمار شاهد و پروبیوتیکی با هم هیچ ارتباط معنی‌داری از خود نشان نداند ( $P > 0/05$ )، اما میزان ترکیبات پروتئین و چربی لاشه در تیمارهای T<sub>1</sub>, T<sub>3</sub> و T<sub>4</sub> یک افزایش از خود نشان دادند، که با تیمار شاهد رابطه معنی‌داری برقرار کرد ( $P < 0/05$ ). یکی از تأثیراتی که پروبیوتیک‌های جنس باسیلوس می‌گذارند، افزایش اشتها از طریق تولید پروتئین‌به-واسطه افزایش آنزیم لیپاز در موجود زنده می‌باشد (Iranso, 2000). از آن-جایی‌که میگوی وانامی توانایی پرورش در شرایط گوناگون محیط و متراکم بالا را دارد (Maia, 2011)، از این‌رو از این گونه می‌توان در شرایط فوق متراکم (بالای 300 عدد در مترمربع) استفاده کرد (Ray, 2010). استفاده از باکتری پروبیوتیک در پرورش متراکم یکی از مهم‌ترین روش‌های محافظتی به-منظور مقابله با باکتری‌ها می‌باشد (Kongnum, 2011). بعضی از نژادهای پروبیوتیک موادی قوی مانند مواد ضدپاتوژن و ضدآلرژی از خود ترشح کرده و باعث بهبود رشد میگو می‌شوند (Laiho, 2002). بیشتر باکتری‌های پروبیوتیکی در دستگاه گوارش از مواد غذایی و

ترین مقدار بودند ولی تیمارهای شاهد به‌دلیل عدم استفاده از پروبیوتیک بیشترین کاهش را از خود نشان دادند و در کل فاکتورها در پایین‌ترین سطح خود بودند. ولی تأثیر تراکم در کل تیمارها یک فرایند ثابت بود، که فقط جز افزایش جزئی در تیمارهای با تراکم کمتر نتوانست اثرات قابل توجه‌ای از خود نشان دهد. بنابراین از نتایج به‌دست آمده در مورد تراکم چنین برآمد که تراکم نمی‌تواند در میزان شاخص‌های رشد تأثیر قابل توجه‌ای داشته باشد. تأثیر پروبیوتیک تجاری در ارتقا معیارهای رشد و افزایش بقاء در آبزیان، در این تحقیق به اثبات رسید. آزمایشات قبل نشان داده، مکمل‌سازی غذایی میگو با پروبیوتیک تجاری باسیلوس تأثیر معنی‌داری روی افزایش فاکتورهای رشد نسبت به میگوی وانامی می‌گذارد (Nejad Ziaei, 2006).

Harotizer و همکاران (2000)

خاطر نشان ساختند یکی از مواردی که پروبیوتیک‌ها ممکن است بر میزان ضریب تبدیل غذایی تأثیر داشته باشند، استفاده غذای خورده نشده به‌وسیله میگو می‌باشد، پروبیوتیک از طریق مصرف این مواد در استخر از بار مواد آلی موجود در استخر کاسته، و موجب تعدیل آلودگی در استخر و افزایش پلانکتون‌ها، در نهایت موجب افزایش تولید در استخر می‌شود. Wang و همکاران (2007) نشان دادند که باسیلوس‌ها دارای آنزیم‌های خارج سلولی از جمله آمیلاز، لیپاز و پروتئاز بوده که قابلیت مکمل‌سازی با جیره‌های غذایی ماهیان به‌منظور ارتقاء سطوح مواد مغذی و رشد لاروهای ماهیان را دارا می‌باشند. یکی از تأثیراتی که پروبیوتیک‌های جنس باسیلوس می‌گذارند این است که باعث افزایش اشتها از طریق تولید پروتئین در موجود زنده می‌شوند (Kanitta, 2012). آن‌چنان‌که از نتایج این آزمایش برمی‌آید (جدول 2)، باکتری-های باسیلوس که دارای غلظت بالایی



این مواد بر بیماری‌های ویروسی مانند لکه سفید و سیستم ایمنی میگو بررسی شود.

### منابع

1. Ai, Q.; Xu, H.; Mai, K.; Xu, W.; Wang, J. and Zhang, W., 2011. Effects of dietary supplementation of *Bacillus subtilis* and fructooligogrowth performance, survival, non-specific immune response and dof juvenile large yellow croaker, *Larimichthys crocea*. *Aquaculture*. Vol. 317, pp: 155-161.
2. Castex, M.; Chim, L.; Pham, D.; Lemaire, P.; Wabete, N.; Nicolas, J.L.; Schmidely, P. and Mariojous, C., 2008. Probiotic *P. acidilactici* application in shrimp *Litopenaeus stylirostris* culture subject to vibriosis in New Caledonia. *Aquaculture*. Vol. 275, No. 1-4, pp: 182-193.
3. Cruz-Suárez, L.E.; Nieto-López, M.; Guajardo-Barbosa, C.; Tapia-Salazar, M.; Scholz, U. and Ricque-Marie, D., 2007. Replacement of fish meal with poultry by-product meal in practical diets for *Litopenaeus vannamei*, and digestibility of the tested ingredients and diets. *Aquaculture*. Vol. 272, pp: 466-476.
4. Cruz-suarez, L.E.; Salazar, M.T.; Cavazos, V.D.; Roch, B.J.; Nieto-Lopez, M.G.; Lemme, A. and Ricque-Marie, R.D., 2009. Apparent dry matter, energy, protein and amino acid digestibility of four soybean ingredients in white shrimp *Litopenaeus vannamei* juveniles. *Aquaculture*. Vol. 292, No. 1-2, pp: 87-94.
5. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Use of probiotics to control furunculosis in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Journal of Fish Diseases*. Vol. 25, pp: 333-342.
6. Laiho, K.; Hoppu, U.; Ouwehand, A.C.; Salmiinen, S. and Isolauri, E., 2002. Probiotics: on-going research on atopic individuals. *British Journal of Nutrition*. Vol. 88, pp: 19-27.
7. Liu, K.F.; Chiu, C.H.; Shiu, Y.L.; Cheng, W. and Liu, C.H., 2010. Effects of the probiotic, *Bacillus subtilis* E20, on the survival, distress tolerance, and immune status of white shrimp, *Litopenaeus vannamei* larvae. *Fish & Shellfish Immunology*. Vol. 28, pp: 837-844.
8. Kongnum, K. and Hongpattarakere, T., 2012. Effect of *Lactobacillus plantarum* isolated from digestive tract of wild shrimpon growth and survival of white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) challenged with *Vibrio harveyi*. *Fish & Shellfish Immunology*. Vol. 32, pp: 170-177.
9. Kumaraguru, V.; Victor-Suresh, K.P. and Chamberlin, G.W., 2009. Growth performance of blue shrimp, *Litopenaeus stylirostris* in self-cleaning microcosm tanks. *Aquaculture*. Vol. 290, pp: 236-242.
10. Maia, E.P.; Olivera, A. and Brito, L.O., 2011. Brazilian shrimp farms for *Litopenaeus vannamei* with partial and total recirculation systems. *Int. J. Aquacult. Sci.* Vol. 2, No. 1, pp: 16-27.
11. Merchie, G.; Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1997. Optimization of dietary vitamin-C in fish and crustacean larvae: a review. *Aquaculture*. Vol. 155, pp: 165-181.
12. Manuch, S.M.; Srivastava, P.P.; Kohi, M.P.S.; Jain, K.K.; Ayyappan, S. and Metar, S.Y., 2013. Combined Effect of Papain and Vitamin-C Levels on Growth Performance of Freshwater Giant Prawn, *Macrobrachium rosenbergii*. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. Vol. 13, pp: 479-486.
13. Michel, C.; Pelletier, C.; Boussaha, M.; Douet, D.G.; Lautraite, A. and Tailliez, P., 2007. Diversity of lactic acid bacteria associated with fish and the fish farm environment, established by amplified rRNA gene restriction analysis. *A.E. Microbiol.* Vol. 73, pp: 47-55.
14. Paiva-maia, D.E.; Alves, M.G. and Brito, O.L., 2013. Effect of a commercial probiotic on bacterial and phyto plankton concentration in intensive shrimp farming (*Litopenaeus vannamei*) recirculation systems. *Aquat. Res.* Vol. 41, No. 1, pp: 12-137.
15. Rengpipat, S.; Rukpratanporn, S.; Piyatiratitivorakul, S. and Me-nasveta, P., 2000. Immunity enhancement in black tiger shrimp (*Penaeus monodon*)

فضاء، با باکتری‌های مضر رقابت کرده و باعث کاهش آن‌ها می‌گردد (Liu، 2010). در پرورش متراکم میگو، یکی از مهم‌ترین احتیاجات، دسترسی به یک جیره مناسب با رشد مناسب می‌باشد، که استفاده از مواد غذایی به کارایی حیوان در جذب این مواد بستگی دارد (Zhang، 2010). از اینرو نقش آنزیم‌های گوارشی در جذب مواد نیز بسیار ضروری می‌باشد که این باکتری‌ها نقش اساسی را در هضم غذا برعهده دارند (Manuch، 2013) که سبب افزایش آنزیم‌های هضم‌کننده، شده که یکی از این آنزیم‌ها، آمیلاز است (Sarez-cruz، 2009) که نقش کلیدی در تعیین قابلیت هضم و تجمع پروتئین در دستگاه گوارش دارد (Manuch، 2013). میگوی پا سفید غربی نسبت به سایر گونه‌ها نیاز پروتئین کمتری در جیره خود دارد، بنابراین جیره غذایی آن می‌تواند از نسبت پروتئین گیاهی بیشتری استفاده کرد (Williams، 2006). باکتری‌های پروبیوتیکی موجود در دستگاه گوارش ماهی سبب افزایش ساخت و ترشح آنزیم‌های گوارشی در میزبان شده (Manuch، 2013) که در نهایت منجر به افزایش قابلیت هضم چربی‌ها و پروتئین‌های موجود در جیره غذایی شده و کارایی تغذیه و متعاقب آن، رشد را در ماهی میزبان به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد (Maia، 2011). Liu و همکاران (2010) عنوان کردند که میزان پروتئین لاشه در بدن ممکن است تحت تاثیر جیره های حاوی پروبیوتیک قرار گیرد، که این واکنش بسته به گونه متفاوت می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که با توجه به تفاوت معنی‌داری که در بعضی از تیمارها مشاهده شد پارامترهای رشد و تغذیه بین تیمار شاهد و تیمارهای آزمایشی حاوی پروبیوتیک سطوح بالاتر توانست بر بهبود عملکرد رشد و در بعضی موارد ترکیبات لاشه تاثیر مهمی داشته باشد. با توجه به تاثیرات مثبتی که برای پروبیوتیک گزارش شد پیشنهاد می‌شود تاثیر



- by a probiont bacterium (Bacillus S11). Aquaculture. Vol. 191, pp: 271-288
16. **Ricque-Marie, D.; Peña-Rodríguez, A.; Tapia-Salazar, M.; Nieto Lopez, M.G.; Villarreal-Cavazos, D.; Guajardo Barbosa, C.; Cruz-Suarez, L.E. and Locatelli, M.L., 2006.** Effect of pre-prandial nutrient leaching in sea water and different binders on apparent amino acid digestibility coefficients of a practical diet in *Litopenaeus vannamei* shrimp juveniles. International Aquafeed. Vol. 9, No. 5, pp: 32-33.
  17. **Ray, A.J.; Seabron, G.; Leffler, J.W.; Wild, S.B.; Lawson, A. and Brody, C.L., 2010.** Characterization of microbial communities in Minimal exchange intensive aquaculture system and effect of suspended solids management. Aquaculture. Vol. 310, No. 1, pp: 130-138.
  18. **Sooking, D.; Silva, D.S.F.; Davis, A.D. and Hanson, R.T., 2011.** Effects of stocking density on the performance of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei* cultured under pond and outdoor tank conditions using a high soybean meal diet. Aquaculture. Vol. 319, pp: 232-239.
  19. **Tovar, D.; Zombonino-Infante, J.L.; Cahu, C.; Gatesoupe, F.J.; Vazquez, R. and Lesel, R., 2002.** Effect of live yeast incorporation in compound diet digestion enzymes activity in sea bass larvae. Aquaculture. Vol. 204, pp: 113-123.
  20. **Wang, Y.B., 2007.** Effect of probiotics on growth performance and digestive enzyme activity of the shrimp *Penaeus vannamei*. Aquaculture. Vol. 269, pp: 259-264.
  21. **Williams, A.S.; Davis D.A. and Arnold, C.R., 2005.** Evidence of a growth factor in some crustacean-based feed ingredients in diets for the giant tiger shrimp *Penaeus monodon*. Aquaculture. Vol. 250, pp: 377-390.
  22. **Yanbo, W. and He, Z., 2008.** Effect of probiotics on alkaline phosphatase activity and nutrient level in sediment of shrimp, *Penaeus vannamei*, ponds. Aquaculture. Vol. 287, pp: 94-97.
  23. **Yusoff, F.M.; Matias-Peralta, H.B. and Shariff, M., 2010.** Phytoplankton population patterns in marine shrimp culture ponds with different sources of water supply. Aquat. Ecosyst. Health. Vol. 13, pp: 458-464.
  24. **Zhang, Y.C.; Ling, H.Y.; Long, R. and Yan, W.L., 2010.** Probiotic applications of two dominant gut Bacillus strains with antagonistic activity the growth performance and improved immune responses of grouper *Epinephelus coioides*. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 29, pp: 803-809.
  25. **Zhou, X.X.; Wng, Y.B. and Li, W.F., 2009.** Effect of probiotic on larvae shrimp (*Penaeus vannamei*) based on water quality, survival rate and digestive enzyme activities. Aquaculture. Vol. 287, pp: 349- 353.

